

Sur l'imago allé d'un Termite du Maroc

par Y. SJÖSTEDT

[note présentée par MM. F. LE CERF et G. TALBOT]

Dans les collections rapportées du Grand-Atlas par la mission F. LE CERF et G. TALBOT, se trouve une espèce de Termite représentée par de nombreux imagos ailés secs, d'autres en alcool ainsi que des ouvriers de la grande et de la petite forme, et quatre soldats (miles minor). Ces derniers correspondent parfaitement aux soldats (minor) de *Hodotermes maroccanus*, dont l'imago ailé était jusqu'ici inconnu.

Cet imago ressemble beaucoup à *Hodotermes Wasmanni* Sjöstr., de la Tunisie et de Uadi m'Bellum (SJÖSTEDT, Rev. Term. Afr., p. 21), mais il est plus grand, surtout la tête qui mesure 2,76-3,00 mm., au lieu de 2,41 chez *Wasmanni*. Les tibias sont noir de poix, teintés de brun jaunâtre seulement au bout extrême; chez *Wasmanni* ils sont en général plus brunâtres et ont le jaune du sommet plus étendu; le ventre est aussi un peu plus jaunâtre et la nervulation des ailes différente.

Hodotermes maroccanus Sjöstr., Rev. Term. Afr., p. 20, 1925.
Imago alati [iné.].

Imago alata splendide nigra; antennis, margine antico epistomatis, labio, apice extremo tibiarum ul abdomine subtus medio brunneo flavidis; alis opaco-hyalinis levissime corneo adumbratis; capite fere circulari sparsim piloso, medio irregulariter et subtiliter striato, antice compresso, epistomate angusto; antennis 23-25 articulatis; pronoto selliformi medio lineâ longitudinali impressa, lobo antico antice curvo, integro, lobo postico majore postice truncato; vena prima sub costa alarum anticarum ramis nullis, secunda ramis 2-5, vena subcosta ramis tribus, mediana et submediana ramis permullis; vena prima et secunda sub costa alarum posticarum simplicibus, subcosta ramis permullis, mediana extus ramosa, submediana ramis numerosis. — Long. corp. 10-11, long. c. alis 18-23, exp. alar. 33-37, alae ant. 15-17, lat. 4,3-4,5 mm.

Imago ailé. — Corps, tête et pattes noir brillant; antennes, labre, sommet des tibias, tarsi, et milieu de l'abdomen brunâtres; ailes opaques-hyalines, très légèrement teintées de brun jaunâtre. Antérieures à première nervure sous la côte courte, simple, la seconde avec 2-5 branches aboutissant à la côte; sous-costale avec trois ou quatre branches aboutissant à la côte; médiane avec deux ou trois branches de chaque côté, les deux extrêmes fourchues; sous-médiane avec des branches nombreuses. Postérieures avec les deux premières nervures